

## Calendário Básico de Vacinação da Criança

Idade	Vacinas	Dose	Doença evitada	Outras vacinas
Ao nascer	BCG-ID	Dose única	Formas graves de tuberculose	
	Vacina contra hepatite B <sup>1</sup>	1ª dose	Hepatite B	
2 meses	Vacina pentavalente (DTP + Hib + HB) <sup>2</sup>	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae tipo b</i>	
	Vacina contra poliomielite inativada	1ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)	
	Vacina oral de rotavírus humano <sup>3</sup>	1ª dose	Diarreia por rotavírus	
	Vacina pneumocócica 10	1ª dose	Pneumonia, otite, meningite e outras	
3 meses	Vacina meningocócica C	1ª dose	Doenças invasivas causadas por <i>Neisseria</i>	
4 meses	Vacina pentavalente (DTP + Hib + HB)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae tipo b</i>	
	Vacina contra poliomielite	2ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)	
	Vacina oral de rotavírus humano <sup>4</sup>	2ª dose	Diarreia por rotavírus	
	Vacina pneumocócica 10	2ª dose	Pneumonia, otite, meningite e outras	
5 meses	Vacina meningocócica C	2ª dose	Doenças invasivas causadas por <i>Neisseria</i>	
6 meses	Vacina pentavalente (DTP + Hib + HB)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae tipo b</i>	
	Vacina injetável poliomielite	3ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)	
9 meses	Vacina contra febre amarela <sup>5</sup>	Dose inicial	Febre amarela	
12 meses	Vacina tríplice viral	Dose inicial	Sarampo, caxumba e rubéola	
	Vacina pneumocócica 10	Reforço	Pneumonia, otite, meningite e outras	
	Vacina meningocócica C	Reforço	Doenças invasivas causadas por <i>Neisseria</i>	
15 meses	Vacina tríplice bacteriana (DTP)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche	
	Vacina oral poliomielite	Reforço	Poliomielite (paralisia infantil)	
	Hepatite A	Dose única	Hepatite A	
4 anos	Vacina tríplice bacteriana (DTP)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche	
	Vacina tríplice viral	2º reforço	Sarampo, caxumba e rubéola	
	Febre amarela	Reforço	Febre amarela	
<b>Campanhas Nacionais para Crianças</b>				
Menores de 5 anos	Vacina oral poliomielite			
De 6 meses a menores de 2 anos	Vacina <i>influenza</i> (gripe)			

FONTE: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Imunizações (PNI). Calendário Básico de Vacinação da Criança online. Brasília; 2016. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br>.

- <sup>1</sup> A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido.
- <sup>2</sup> O esquema de vacinação é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina pentavalente e dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.
- <sup>3</sup> É possível administrar a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano entre 6 e 14 semanas de vida.
- <sup>4</sup> É possível administrar a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano entre 14 e 24 semanas de vida. O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.
- <sup>5</sup> A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e áreas de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre amarela 10 dias antes da viagem.

Líder, este é o calendário básico de vacinação da criança. Se no município onde você mora são aplicadas outras vacinas, anote-as na última coluna.