



Nome da gestante: _____

Nome do líder: _____

Comunidade: _____

Cartelas	Data de entrega para a gestante
1A. Os primeiros mil dias e a nossa saúde	____/____/____
1B. Os primeiros 3 meses de gravidez	____/____/____
2. Pré-Natal - por que é importante fazer?	____/____/____
3A. Sinais de Perigo - Gestante	____/____/____
3B. Plano de emergência	____/____/____
4. 4º, 5º e 6º mês de gravidez	____/____/____
5. Alimentação da gestante	____/____/____
6. Álcool e drogas: quanto mais longe, melhor!	____/____/____
7A. 7º, 8º e 9º mês de gravidez	____/____/____
7B. Plano de parto	____/____/____
8. Sinais de trabalho de parto	____/____/____
9. O nascimento do bebê	____/____/____
10A. A 1ª semana de vida do bebê	____/____/____
10B. Dormir de barriga para cima é mais seguro	____/____/____
11. Sinais de Perigo - Bebê de até 2 meses	____/____/____
12. O primeiro mês de vida	____/____/____
13. Sinais de Perigo - Criança de 2 meses a 5 anos	____/____/____
14. O bebê de 4 e 5 meses	____/____/____
15A. O bebê de 6 a 8 meses	____/____/____
15B. Introdução de alimentos para crianças amamentadas	____/____/____

Líder, o ideal é acompanhar a gestante desde o **primeiro mês** de gestação. Nesse mês são entregues e usadas as cartelas 1A e 1B para ler e conversar com a gestante e, sempre que possível, com o pai do bebê. Caso o acompanhamento da gestante comece depois do primeiro mês de gestação, há necessidade de usar mais de duas cartelas na visita. Se a **primeira visita** acontecer no:

- **2º mês:** use as cartelas 1A, 1B e 2;
- **3º mês:** use as cartelas 1A, 1B, 2 e 3A e 3B;
- **4º mês:** leia e converse primeiro sobre as cartelas 1A e 4 e, em seguida, sobre as cartelas 2 e 3A e 3B;
- **5º mês:** na primeira visita, leia e converse sobre as cartelas 1A, 4, 2, 3A e 3B; na segunda visita, cartelas 5 e 6;
- **6º mês:** faça na mesma ordem sugerida para o 5º mês. Na terceira visita, use as cartelas 7A e 8;
- **7º mês:** leia e converse primeiro sobre as cartelas 1A e 7A e 7B e, em seguida, sobre as cartelas 3A, 3B e 5. Na 2ª visita leia as cartelas 6 e 8;
- **8º mês:** na primeira visita, use as cartelas 1A, 7A, 7B, 3A, 3B e 5; na segunda visita, as cartelas 8 e 9;
- **9º mês:** leia e converse sobre as cartelas 1A, 7A, 7B, 8 e 9 na primeira visita.

Importante: a partir do 4º mês de gestação, nem todas as cartelas serão usadas durante a visita. Mesmo assim, estas cartelas devem ser entregues para que a gestante possa ler mais tarde e guardar como lembrança.

Quando o **bebê nascer**, use as cartelas 10A, 10B e 11. Na visita seguinte, ainda no **primeiro mês de vida**, use as cartelas 12 e 13.

Continue visitando mensalmente e quando o bebê **completar três meses**, entregue a cartela 14. Quando ele **completar cinco meses**, entregue a cartela 15A e 15B.



Querida.....
Que a paz, o bem, o amor
e a ternura habitem em
seu coração.
Com carinho,.....

Laços de Amor



CNBB

Para que todas as
crianças tenham vida



OS PRIMEIROS 1000 DIAS E A NOSSA SAÚDE

É essencial que o bem-estar da criança seja pensado sempre, começando já no início da gestação.

270 dias (9 meses da gestação)
+ **365 dias** (1º ano de vida)
+ **365 dias** (2º ano de vida)

1000 dias

Estudos comprovam que o cuidado dedicado nos primeiros 1000 dias do bebê são primordiais para uma vida saudável, mesmo depois de adulto. Por isso, informe-se e saiba como garantir vida plena para seu bebê desde agora!

270 dias (9 meses da gestação)

Possíveis problemas:

- Bebês com atraso no crescimento dentro do útero ou que nascem com baixo peso (menos de 2,5 kg) apresentam mais riscos de desenvolver diabetes, obesidade, colesterol elevado, pressão alta, osteoporose, doenças renais e do coração quando adultos.
- As cesarianas acarretam quatro vezes mais infecções pós-parto e três vezes mais doenças e mortes maternas.
- Crianças nascidas duas semanas antes da hora têm muito mais chances de desenvolver problemas respiratórios.

Como cuidar:

- Acompanhamento pré-natal durante toda a gestação em um serviço de saúde, com atenção especial para as gestantes pobres e acima dos 30 anos.
- Não fazer uso de fumo, álcool e drogas.
- Alimentação saudável.
- Respeitar o tempo da criança, aguardando seus sinais para nascer, e ter parto normal.

365 dias + 365 dias (1º e 2º ano de vida)

Aleitamento Materno:

Exclusivo até os 6 meses e, a partir desta idade, complementado com outros alimentos até 2 anos ou mais.

Proteção para a mãe:

- Redução do risco de câncer de mama.
- Redução do risco de câncer de ovário.
- Redução do risco de diabetes.

Proteção para a criança:

- Redução dos casos de diarreia, infecções respiratórias, infecções no ouvido e problemas no posicionamento dos dentes.
- Promove o crescimento e ganho de peso adequados.
- Ajuda na prevenção do diabetes e obesidade na adolescência e depois de adulto.

Crianças que são amamentadas por mais tempo têm maior inteligência do que aquelas que são amamentadas por períodos mais curtos ou não são amamentadas, o que pode melhorar o desempenho escolar e, a longo prazo, aumentar sua renda.

Para saber mais sobre a Pastoral da Criança e suas atividades, converse com nosso líder comunitário e visite nosso site na internet: **www.pastoraldacrianca.org.br**



OS PRIMEIROS TRÊS MESES DE GRAVIDEZ

Como você e seu companheiro se sentiram ao saber da gravidez? Felizes, ansiosos, preocupados?

Seja qual for a situação, o que acham de conversar com uma pessoa amiga sobre seus sentimentos?

**Você é uma fonte rica do amor de Deus!
Seu ventre deve ser um templo de saúde,
amor e paz para o bebê.**

Olá mamãe! Ainda sou muito pequenino, mas estou feliz por estar aqui com você! Meu coração já bate e faz o sangue correr pelo meu corpo. Para que eu cresça e nasça com um bom peso, é importante que você se cuide e se alimente bem, viu?

É comum a mulher grávida mudar da alegria para a tristeza de uma hora para outra. Ela pode ficar com vontade de chorar e ansiosa. Isso acontece por causa da mudança de hormônios no corpo. Com o passar dos meses, estes sentimentos vão se acalmando.


Fraquezas e desmaios podem acontecer se você mudar rápido de posição ou ficar sem comer por muito tempo. Coma mais vezes ao dia e descanse sempre que puder.

Nestes primeiros meses de gravidez é comum sentir enjoô e ânsia de vômito. Para evitar isso, coma pão seco ou biscoito logo pela manhã e não coma alimentos muito gordurosos e apimentados.

Você pode contar comigo, que sou Líder da Pastoral da Criança: vou ouvir e partilhar o que sei com você.

Procure logo o serviço de saúde para fazer o PRÉ-NATAL.





PRÉ-NATAL - POR QUE É IMPORTANTE FAZER?

Mamãe, cuidando da sua saúde você está cuidando da minha também. Assim você vai se sentir bem e eu vou nascer bem fortinho!

Você está mais iluminada, pois carrega no seu ventre uma nova vida!

O pré-natal é um atendimento médico próprio para você, gestante. Nele você recebe orientações e cuidados para manter a sua saúde e a do bebê.

São necessárias pelo menos seis consultas de pré-natal numa gestação que não seja de risco. Gestação de risco é aquela em que algum problema ou doença pode complicar a gravidez.

As datas das consultas vão depender do tempo de gravidez que você tiver quando começar o pré-natal. Pelo menos duas consultas do pré-natal são feitas com o médico, as outras podem ser com o enfermeiro.

Você deve receber o Cartão da Gestante logo na primeira consulta de pré-natal. Leve-o com você sempre que for ao serviço de saúde, pois nele é anotado tudo o que acontece na sua gravidez. Isso vai ajudar você a ter um melhor atendimento médico.

Nas consultas de pré-natal você vai:

- Saber como está sua saúde;
- Saber como o bebê está crescendo;
- Saber mais ou menos quando o bebê vai nascer;
- Saber como se alimentar melhor e quais os cuidados que precisa ter com você mesma;
- Ter os seios examinados para descobrir se tem caroço e realizar o exame preventivo do câncer de colo do útero, caso o último exame tenha sido feito há mais de um ano;
- Receber sulfato ferroso para prevenir a anemia;
- Receber orientações sobre o aleitamento materno;
- Ser encaminhada para tomar a vacina contra o tétano, caso não tenha tomado todas as doses.

No oitavo mês de gestação, as consultas de pré-natal devem ser feitas a cada duas semanas. No último mês, devem ser feitas uma vez por semana.



SINAIS DE PERIGO - GESTANTE

Procure imediatamente o hospital se algum desses sinais aparecer.



**Vomita tudo o que
come ou que bebe**



**Pernas e braços
bem inchados**




A partir do 7º mês
de gestação,
observe também:
**Bebê que não se
mexe ou que se
agita muito.**



**Febre alta /
Dor de cabeça**



Sangramento



**Perda de
líquido**

3A

Duas doenças podem trazer problemas para a saúde da gestante e do bebê. Uma delas é a **INFECÇÃO URINÁRIA**, que se não for tratada a tempo, pode causar infecção nos rins, aborto e fazer o bebê nascer antes do tempo.

Para prevenir a infecção urinária tome mais líquido, vá ao banheiro sempre que tiver vontade e esvazie bem a bexiga.

Outra doença que pode aparecer na gestação é a **ECLÂMPSIA**. Esta doença faz com que você sinta dor de cabeça e seu rosto, mãos e pés ficam bem inchados. Se isto acontecer, vá depressa para o hospital e explique o que está sentindo.

Se estas doenças forem tratadas logo, a gestação pode seguir até o final sem maiores problemas.

Embora a maioria das gestações seja tranqüila, é sempre bom saber antes para onde ir se aparecer algum problema. Pergunte sobre isso na consulta do pré-natal.

**Converse com a sua família, amigos e vizinhos
para ver quem pode ajudar você
se aparecer algum problema e
como chegar mais rápido ao hospital.**



PLANO PARA EMERGÊNCIAS



Mesmo com todos os cuidados, algum sinal de perigo pode acontecer e você precisa planejar sua ida ao hospital.

Em caso de emergência, você deve ser levada para:

Nome do hospital: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Como levar? _____

É possível chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ligando para o número **192**, caso exista este serviço em seu município.

É importante levar a Caderneta da Gestante
para facilitar seu atendimento.

Quem pode levar você ao hospital? (anotar os dados de 2 pessoas)

Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Se você tem outros filhos, anote os dados da pessoa que vai ficar com eles:


Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Esta cartela deve ficar em um lugar da casa onde possa ser vista por todos, por exemplo, na porta da geladeira. Evite deixar ao alcance de crianças, pois podem tirar, rasgar ou perder a cartela.





4º, 5º E 6º MÊS DE GRAVIDEZ

A anemia é uma doença comum na gestação. Ela causa cansaço, falta de vontade de fazer as coisas e pouco apetite. No bebê, a anemia causa baixo peso ao nascer e ele fica fraquinho.

Para não ter anemia, além de comer alimentos saudáveis, você deve tomar o sulfato ferroso, que é receitado na consulta do pré-natal.

Para evitar gases, azia e má digestão, coma devagar mastigando bem os alimentos.

O carinho que o bebê recebe na barriga da mãe é um sinal da doçura, da suavidade e do amor profundo de Deus!

Olá mamãe! Agora já consigo me mexer, abro e fecho os olhos, mexo as mãos, dou chutes, chupo os dedos, faço caretas. Já conheço a sua voz e a do papai. Gosto quando vocês conversam comigo e sinto quando fazem carinho na barriga da mamãe.

É comum os pés incharem e aparecerem varizes nas pernas. Isso acontece porque o útero vai crescendo e aperta algumas veias da barriga, dificultando o retorno do sangue das pernas para o coração.

Para diminuir o inchaço, faça caminhadas e evite ficar muito tempo sentada ou deitada. Quando estiver deitada, coloque um apoio embaixo das pernas para deixá-las mais elevadas.

Cuide dos seus dentes! Evite alimentos doces para não ter cáries e problemas na gengiva. Escove os dentes, a língua e a gengiva após cada refeição e passe fio dental pelo menos uma vez ao dia.

Por causa dos hormônios da gravidez, é comum as gengivas sangrarem. Mesmo que isso aconteça, continue cuidando da limpeza da boca e consulte o dentista da unidade de saúde.

Você pode usar como fio dental uma linha de costura bem grossa, ou tiras bem finas de pacote de leite ou de sacolas plásticas, que devem estar limpas.





ALIMENTAÇÃO DA GESTANTE

Olá, mamãe! Continuo crescendo e ganhando peso. Obrigada por cuidar tão bem de mim! Não vejo a hora de estar bem pertinho, ser amamentado, tocado e amado por você.

**Você está cheia de “graça”!
É a luz do Senhor que vem de dentro de você.**

Você precisa ter uma alimentação rica em ferro, vitamina C, vitamina A, iodo e cálcio para ficar saudável e para o bebê crescer e nascer com um bom peso.

O **ferro** ajuda a prevenir a anemia e é encontrado nas carnes, vísceras, feijão e outros vegetais de vagem, castanha do brasil, de caju e amendoim. O ferro desses alimentos é melhor aproveitado quando se come alimentos ricos em vitamina C e A juntos na mesma refeição.

A **vitamina C** ajuda a fechar as feridas e evita infecções e sangramentos. É encontrada nas frutas e verduras cruas.

A **vitamina A** ajuda a prevenir diarreia e infecções, protege a visão e ajuda no crescimento do bebê no útero. Ela é encontrada em legumes alaranjados e vermelhos, folhas verde-escuras, frutos amarelos e de palmeiras, leite, queijos e gema de ovo.

O **iodo** é importante para o crescimento do bebê. É encontrado no sal de cozinha, peixes e mariscos. O cálcio ajuda a formar e manter dentes e ossos fortes. É encontrado no leite, queijo, coalhada, iogurte, folhas verde-escuras, gergelim e peixes pequenos.

Tomar café, chá mate, chá preto, leite, refrigerantes ou produtos que tenham chocolate perto do almoço ou do jantar dificulta o aproveitamento do ferro dos alimentos pelo nosso corpo.

Feijão com arroz é um prato nutritivo. Peixe com farinha também. Esses pratos ficam melhores ainda se você comer junto com verduras, legumes e frutas.

Além de cuidar da sua alimentação, é importante você ir se preparando, com amor e conhecimento, para oferecer o melhor alimento para seu filho: o leite materno.





ÁLCOOL E DROGAS: QUANTO MAIS LONGE, MELHOR!

Olá, mamãe! Eu te amo tanto e sinto que você me ama também. Não faça coisas que possam fazer mal para a nossa saúde e para a nossa felicidade, tá? Vou precisar muito da sua força e do seu exemplo de vida para me tornar uma boa pessoa.

**A maternidade é a experiência mais profunda do Deus Criador!
Ser mãe é continuar a obra de Deus!**

O cigarro e o álcool, apesar de não serem proibidos por lei, são drogas que causam graves problemas para a gestante e o bebê.

O cigarro aumenta as chances da gestante ter abortos e sangramento. O bebê pode nascer com baixo peso ou antes do tempo, ter problemas de respiração, no coração e também pode morrer de uma hora para outra (morte súbita).



Quando a gestante toma bebida alcoólica durante a gravidez, corre risco de abortar. O bebê pode nascer com baixo peso, além de ter tremores, ficar mais irritado, mamar pouco e dormir mal.

Os bebês que são muito afetados pelo álcool e que conseguem sobreviver aos primeiros dias de vida, podem ficar com problemas físicos e mentais.

Se a gestante usa drogas como a maconha, cocaína, crack ou outras, pode ter aborto ou parto antes do tempo.

No bebê, estas drogas podem causar sérios problemas de crescimento, de respiração e também problemas no cérebro e no coração.

Tenha cuidado com tintas, cola e solventes. Isso também pode fazer mal para a sua saúde e a do bebê.

Alguns remédios também podem causar problemas no crescimento do bebê no útero. Por isso, use remédios só com receita médica e com o conhecimento do médico do pré-natal!



7º, 8º E 9º MÊS DE GRAVIDEZ

Querida gestante, você pode sentir seus seios cheios e pesados. É porque seu corpo está se preparando para amamentar. Pode também começar a sair um leite amarelado do bico do seu seio. É o colostro, o primeiro leite que seu bebê vai receber, que será fonte de muita saúde para ele.

Se você fizer trabalho pesado e se cansar muito, o bebê pode nascer antes do tempo. É importante receber ajuda do companheiro e da família nas tarefas de casa ou no que for necessário.

Bendito é o fruto do seu ventre, pois ele é o símbolo da presença do Senhor Deus.

Oi, mamãe! Já estou bem grandinho. Já consigo abrir e fechar os olhos e as mãos. Logo a gente vai poder se ver! Fique tranquila, vai dar tudo certo!

Por causa do peso da barriga podem aparecer hemorróidas, que são varizes no ânus. Se o intestino ficar preso, elas podem piorar.

Para o intestino funcionar bem, tome bastante líquido, faça caminhadas e coma alimentos ricos em fibras: saladas de folhas verde-escuras (inclusive aproveitando os talos), frutas, verduras, aveia, centeio e outros alimentos da região.

O parto é um momento muito importante na vida da mãe e do bebê. A preocupação com a hora do parto e a chegada do bebê podem tirar o seu sono.

Conversar sobre suas preocupações com o companheiro, com sua família e amigos pode aliviar essa ansiedade. E eu, como Líder da Pastoral da Criança, também quero ouvir você!

Antes do último mês de gravidez veja com seu companheiro, familiares, amigos ou vizinhos como será sua ida para o hospital ou maternidade.



PLANO DE PARTO

Gestante, organizar o que você vai usar no hospital previne o corre-corre e esquecimentos de última hora. Você deve:

- **preparar uma sacola ou bolsa grande com roupas para você e o bebê saírem do hospital.**
- **levar documento de identidade ou certidão de nascimento ou de casamento.**
- **levar a sua Caderneta da Gestante.**

Em que hospital você terá o bebê? _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Quem vai levar você ao hospital (anotar os dados de pelo menos 2 pessoas)?

Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____

Se já tem outros filhos, quem vai cuidar deles enquanto você estiver no hospital?

Nome: _____

Endereço: _____

Telefones: _____





SINAIS DE TRABALHO DE PARTO

Mamãe, estou quase chegando! Não vejo a hora de estar bem pertinho de você, ficar no seu colo e ser amado por você, pelo papai e por toda a minha família!

**Dar à luz a um bebê é mostrar ao mundo
o rosto carinhoso do Criador!**

Os sinais de que a hora do parto se aproxima podem ser diferentes para cada mulher e também de uma gravidez para outra. Se é o primeiro filho, em geral, o trabalho de parto é mais demorado.

Alguns sinais indicam que a hora do parto se aproxima:

- Dor que começa nas costas e vai para a parte baixa da barriga.
- Grande perda de água pela vagina, que acontece quando a bolsa de água que envolve o bebê se rompe.
- Contrações, que é quando a barriga fica dura e logo depois amolece. Elas começam devagar e vão ficando mais fortes e mais perto umas das outras.

Se você mora perto do hospital ou maternidade, pode esperar até que as contrações aconteçam de 10 em 10 minutos.

Se mora longe, programe sua ida mais cedo ou fique hospedada em um local mais próximo de onde vai ter o bebê.

Veja com algum parente ou conhecido quem pode cuidar da sua casa e dos outros filhos enquanto você estiver fora.

Lembre de levar para o hospital:

- o seu Cartão da Gestante;
- a sua carteira de identidade ou outro documento;
- algumas roupas para você e para o bebê.

Quando o bebê nasce de parto normal, fica mais ativo e você se recupera mais rápido. A cesariana só deve ser feita se houver necessidade.





O NASCIMENTO DO BEBÊ

Mamãe e papai, acho que tudo vai ser tão diferente! Vou querer mamar e ficar no colo quentinho da mamãe para me sentir melhor e ir me acostumando com a vida aí fora!

**O nascimento de uma criança é o milagre de Deus que se realizou!
Que essa criança seja motivo de paz e alegria para toda a família!**

Após o parto, se tudo estiver bem, mãe e bebê devem ficar juntos no mesmo quarto. Isso se chama Alojamento Conjunto. Assim, o bebê pode mamar sempre que quiser e a mãe pode perceber quando alguma coisa não vai bem com ele.

O leite de peito é completo, tem tudo o que o bebê precisa para crescer até os seis meses de idade. É o jeito mais seguro, barato e simples de alimentar seu bebê. Ele já sai preparado e na temperatura certa direto do seu peito para a boquinha do bebê.

Bebê que mama só no peito não precisa de chá, suco ou água. Além de estar bem alimentado, ele vai se sentir protegido com o calor do seu corpo coladinho ao dele.

O tipo da mama e do bico do seio não são problemas para a amamentação. O que importa é o jeito que o bebê pega o peito para sugar o leite.

Para mamar bem no peito, o bebê precisa estar acordado. A boca deve pegar a maior parte do mamilo. O lábio inferior do bebê deve ficar virado para fora e o queixinho dele deve encostar bem na mama da mãe.

Se você tiver dificuldade para amamentar, peça ajuda ao médico ou enfermeiro o mais rápido possível.

Bebê que mama só no peito tem menos diarreia, pneumonia, dor de ouvido e alergias. Não existe leite materno fraco!





A 1ª SEMANA DE VIDA DO BEBÊ

Mamãe e papai! Preciso de muita atenção e carinho para crescer com saúde e feliz! Vou mudar completamente a vida de vocês. A cada dia vamos aprendendo juntos como viver melhor.

**Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram!
Mamãe, cuidar do seu bebê exige amor e dedicação.**

O bebê não tem hora certa para mamar. Dê o peito sempre que ele quiser. Quando amamentar, olhe carinhosamente para o bebê, diga palavras suaves, faça toques delicados. Isso faz o bebê se sentir amado e protegido.

Quando o bebê nasce antes do tempo ou tem baixo peso, é preciso acordá-lo para mamar mais vezes durante o dia e também à noite. Assim ele recupera o peso mais rápido.

Na hora do banho, deixe perto tudo que vai ser usado. Sinta a temperatura da água antes de colocar o bebê no banho.

Para evitar assaduras, troque as fraldas sempre que estiverem molhadas, limpe e seque bem a bundinha e as dobrinhas do corpo do bebê.

A limpeza e o curativo do umbigo devem ser feitos todos os dias, até que o umbigo caia. No banho, lave sem medo o umbigo com água e sabão e seque bem.

Passe no umbigo **álcool a 70%**. Ele pode ser comprado na farmácia ou conseguido no posto de saúde.

Não coloque faixa ou umbigueira porque dificulta a respiração do bebê e não deixa o umbigo secar.

**O bebê precisa da Certidão de Nascimento para ser um cidadão!
Esse documento é feito de graça no cartório de sua cidade.**





Dormir de barriga para cima é mais

É possível reduzir em
mais de 70% a morte
súbita de bebês.

10B

Dormir de barriga para cima é mais seguro!

É possível reduzir em mais de 70% a morte súbita de bebês. Para isso:

- **Coloque o seu bebê para dormir de barriga para cima.**
- **Amamente** até o 6º mês, dê somente leite materno.
- **Não fume e nem deixe que fumem dentro da sua casa,** principalmente durante a gestação e na presença de crianças pequenas.
- **Não agasalhe demais** o bebê.
- **Deixe fora do berço travesseiros, brinquedos,** almofadas e outros objetos fofos.

Mais informações **com a sua Líder**

SINAIS DE PERIGO - BEBÊ DE ATÉ 2 MESES

Procure imediatamente o hospital se o bebê apresentar algum desses sinais.



**Não pega o
peito ou não
consegue se
alimentar**



**Bebê mais
molinho, parado
e com choro
fraco ou
gemente**



**Febre alta
(temperatura
maior ou igual a
38° C)**



**Temperatura
baixa (menor ou
igual a
35° C)**

SINAIS DE PERIGO - BEBÊ DE ATÉ 2 MESES

Procure imediatamente o hospital se o bebê apresentar algum desses sinais.




"Ataque"
(Convulsões)



Diarreia



**Umbigo
vermelho ou
com pus**



**Muitas bolhas
com pus no
corpo**



O PRIMEIRO MÊS DE VIDA

Mamãe e papai! Choro quando quero colo, quando tenho fome, dor, frio ou porque estou molhado. Esse é o meu jeito de dizer o que sinto. Aos poucos vocês vão entendendo melhor o que eu preciso!

Mamãe e Papai! Que seu lar possa dar a essa criança o amor e a felicidade que ela merece!

A presença e a ajuda do companheiro e das pessoas da família são muito importantes para a sua tranquilidade e a do bebê.

O pai não pode dar o peito, mas pode dar apoio para você, dando banho, trazendo o bebê para mamar, pegando no colo para arrotar, para fazer dormir, ajudando a arrumar a casa...

Procure descansar nos horários em que o bebê dorme, para poder dar a atenção que ele precisa quando acorda para mamar.

Pegar o bebê no colo quando ele chora não o acostuma mal. Para ele, isso é sinal do amor e da atenção dos pais e faz com que ele se sinta mais seguro.

A melhor posição para o bebê dormir é de barriga para cima e com a cabeça um pouco mais alta. Assim ele respira melhor e não tem perigo se vomitar.

É bom para o bebê tomar um pouco de sol todos os dias, antes das 9 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Nesses horários o sol é fonte de saúde.

Lembre de ir à consulta de revisão do parto. Leve o bebê para tomar a vacina BCG, contra Tuberculose, se ainda não tiver tomado. Ele precisa tomar também a segunda dose da vacina contra a Hepatite B.

Aos dois meses de idade,
o bebê precisa tomar a primeira dose das vacinas:

- contra a paralisia infantil;
- contra a diarreia por rotavírus;
- contra o tétano, difteria, tosse comprida, meningite e outras infecções causadas por bactérias.



SINAIS DE PERIGO - CRIANÇA DE 2 MESES A 5 ANOS

Procure imediatamente o hospital se a criança apresentar algum desses sinais.




**Não mama, não
bebe ou não se
alimenta**



**Fica molinha,
com choro fraco
ou gemendo
muito**



**"Ataque"
(Convulsão)**



**Grande perda de
peso, palidez e
inchaço nos dois
pés**

SINAIS DE PERIGO - CRIANÇA DE 2 MESES A 5 ANOS

Procure imediatamente o hospital se a criança apresentar algum desses sinais.



Tem dificuldade para respirar:


- Ruído esquisito ao respirar (estridor);

- Aparecem as costelas quando puxa o ar (Tiragem subcostal)

Procure imediatamente o hospital se a criança apresentar algum desses sinais.



Vomita tudo



Se está com diarreia e fica desidratada:

- sinal da prega
- olhos fundos



O BEBÊ DE 4 E 5 MESES

Mamãe e papai, sei que vocês têm tantas outras coisas para fazer... mas arranjem um tempinho todos os dias para ficar só comigo, me abraçar, conversar e mostrar as coisas com que eu posso brincar. Preciso muito da atenção, dos cuidados e do amor de vocês!

O Reino de Deus pertence às criancinhas! Jesus abraçava as crianças, conversava com elas. Ser pai e mãe é seguir o exemplo de Jesus!

O leite materno continua sendo o melhor alimento para o seu bebê. Se ele toma só leite materno é normal que ele seja mais gordinho.

Depois dos quatro ou cinco meses mamando só no peito, o bebê continua ganhando peso, só que mais devagar. Isso é normal e não quer dizer que o seu leite é fraco.

Caso você precise voltar ao trabalho, converse comigo, seu líder da Pastoral da Criança, sobre como tirar e guardar seu leite para ser dado ao bebê enquanto você estiver fora.

O bebê às vezes chora quando fica sozinho. Descubra maneiras de realizar as tarefas da casa com ele perto, para que possam se olhar e conversar.

Nessa fase, é bom para o bebê ter hora certa para o banho, para comer e dormir. Ele fica nervoso e inseguro quando há muita mudança no seu dia-a-dia.

Após cada mamada, passe um pano limpo e umedecido na gengiva, bochecha e língua do bebê. Isso tira os restos de leite e o bebê vai se acostumando com a boquinha limpa.

- Aos quatro meses de idade,
o bebê precisa tomar a segunda dose das vacinas:**
- contra a paralisia infantil,
 - contra a diarreia por rotavírus,
 - contra o tétano, difteria e tosse comprida, meningite e outras infecções causadas por bactérias.





O BEBÊ DE 6 A 8 MESES

Mamãe, mesmo comendo da sua comidinha, ainda preciso mamar no peito, viu? Assim fico mais forte e saudável e me sinto mais feliz pertinho de você!

**Queridos pais! Sejam alegres, humildes, amáveis e pacientes.
Mantenham entre a família laços de Paz,
para conservar a unidade do Espírito!**

O bebê vai começar a experimentar outros alimentos além do leite materno. Isso exige paciência da mãe ou de quem cuida do bebê. Não se deve forçar nem bater para ele comer. Ele precisa estar calmo para poder se alimentar bem.

No início, a comida precisa ser amassada, pois o bebê ainda não sabe mastigar. Aumente cada dia um pouco a quantidade de comida para o bebê.

Quando o bebê cospe a comida, isto não significa que ele não gostou, mas que está estranhando uma coisa que ainda não conhece. É preciso oferecer a mesma comida num outro momento.

Os alimentos do bebê não devem ser adoçados. O açúcar é uma das principais causas do aparecimento de cárie nos dentes.

Continue limpando a boca do bebê com o paninho e comece a escovar os dentinhos que estão nascendo, sem pasta, principalmente antes de dormir.

Se o bebê tiver diarreia, continue a dar comida e ofereça também o soro caseiro em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Isso evita a desidratação, que é a perda de muito líquido do corpo.

Fale comigo caso você tenha alguma dúvida de como preparar o soro caseiro ou precisar de colher-medida.

- Aos seis meses de idade,
o bebê precisa tomar a terceira dose das vacinas:**
- contra hepatite B,
 - contra paralisia infantil,
 - contra tétano, difteria, tosse comprida e meningite e outras infecções causada por bactérias.



Introdução de alimentos para crianças amamentadas



**Após completar
6 meses**

Leite materno
no intervalo
das refeições

**Após completar
7 meses**

Leite materno
no intervalo
das refeições

**Após completar
8 meses**

Leite materno
no intervalo
das refeições

**Após completar
12 meses**

Leite materno
no intervalo
das refeições

Meio da manhã

Papa de fruta

Papa de fruta

Papa de fruta

Fruta

Almoço

Papa principal

Papa principal

Aos poucos passar
para a comida
da família*

Comida da
família

Meio da tarde

Papa de fruta

Papa de fruta

Papa de fruta

Fruta

Jantar

Leite materno

Papa principal

Aos poucos passar
para a comida
da família*

Comida da
família

* A partir dos 8 meses a criança já pode receber a comida feita para a família, mas os alimentos devem ser amassados, desfiados, picados ou cortados em pedaços pequenos, temperados com pouco sal. Procurar usar mais temperos naturais.

15B

Introdução dos alimentos:

- O leite materno é completo, é o único alimento que seu bebê precisa até os 6 meses de idade, ou seja, não é preciso oferecer água, suco, chá ou outro tipo de leite nesse período.
- O leite materno deve ser mantido até, pelo menos, os dois anos de idade, mesmo após a introdução de novos alimentos.
- Nem sempre a criança aceita um alimento novo na primeira tentativa. É preciso oferecer o mesmo alimento, preparado de maneiras diferentes, em média de 8 a 10 vezes até que ela passe a gostar.
- Frutas e verduras devem ser oferecidas uma de cada vez, na forma de papa ou purê. Açúcar e sal não devem ser adicionados às papinhas.
- Os alimentos devem ser cozidos em pouca água e depois bem amassados com o garfo. Não use liquidificador.
- Quem determina quanto a criança vai comer é ela mesma. Toda criança consegue perceber quando já está com o estômago cheio.

**Mais informações sobre a introdução de alimentos
no Guia do Líder, páginas 179 a 184.**